

Kartlegging av viktige fugleområder i Hemsedal i 2025



Miljøfaglig
Utredning

Rapport MU2025-92

Forsidebilde

Myrhauk (EN), her en voksen hann, ses av og til – og helst i gode smågnagerår, i lavalpine deler av Hemsedal kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen.

RAPPORT 2025-92

Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS	Prosjektansvarlig: Bjørn Harald Larsen
	Prosjektmedarbeider(e): Geir Høitomt (Kistefos Skogtjenester AS)
Oppdragsgiver: Hemsedal kommune/Biofokus	Kontaktperson hos oppdragsgiver: Jørn Magne Forland
Referanse: Larsen, B. H. & Høitomt, G. 2025. Kartlegging av viktige hekkeområder for fugl i Hemsedal i 2025. Miljøfaglig Utredning Rapport 2025-92. 23 s. ISBN 978-82-345-0805-9.	
Referat: Miljøfaglig Utredning AS har i samarbeid med Geir Høitomt i Kistefos Skogtjenester utført en kartlegging av viktige hekkeområder for fugl i Hemsedal kommune i 2025. Feltarbeidet ble utført fra slutten av mai til begynnelsen av juli. Dårlig vær og flomstore elver var en utfordring og gjorde at feltrundene i slutten av juni og begynnelsen av juli fikk noe redusert utbytte. Følgende områder ble undersøkt: • Vavatn inkl. Tangane • Hydalen • Ranastongi-Storebotn • Grøndalen • Bulidalen • Deler av Vannen (Helgetjerne, Vanneviki og Vestretjerne med myrer sør for Registreringene av Asplan Viak i 2021 og 2022 omfattet de viktigste kjente hekkeområdene for våtmarksfugl i kommunen, og områdene som ble undersøkt i 2025 var ikke like viktige. De hadde enten lokal eller regional verdi, med flest i den første kategorien. Det viktigste området for hekkende våtmarksfugl var Hydalen, med Sør-Hydalsvatnet (inkl. Mjåsundet), Fetjane, Geitevatnet og Nord-Hydalsvatnet. Hekking av fiskeørn ble påvist ved Vestretjerne i Vannen, og dette er første hekkefunn i kommunen og samtidig ett av de høyestliggende fiskeørnreirene i landet. I 2021 og 2022 ble få høyfjellsområder undersøkt. Vi kartla høyfjellfaunaen av fugl i området Ranastongi-Storebotn, hvor det bla. ble registrert fjellerke og boltit. Et forsøk på å undersøke Grøndalsbotn mislyktes pga. flomstore elver.	

FORORD

Miljøfaglig Utredning AS har som underleverandør for Biofokus utført kartlegging av fugl i utvalgte områder i Hemsedal kommune i 2025. Vi leide i tillegg inn Geir Høitomt i Kistefos Skogtjenester til å utføre deler av feltarbeidet.

Asplan Viak gjorde en tilsvarende kartlegging i 2021 og 2022, som omfattet de mest kjente og verdifulle fugleområdene i kommunen. I rapporten fra den kartleggingen ble det avslutningsvis pekt på noen aktuelle områder som ikke ble undersøkt dette året, og det var utgangspunktet for valg av områder i 2025.

Kontaktperson hos oppdragsgiver Hemsedal kommune har vært miljøvernleiar i Hemsedal og Gol Jørn Magne Forland, som takkes for bistand og tips om aktuelle områder/arter i arbeidet. Prosjektansvarlig i Miljøfaglig Utredning har vært Bjørn Harald Larsen.

Eina, 5.12.2025

Miljøfaglig Utredning AS

Bjørn Harald Larsen

INNHold

FORORD	4
INNHold	5
1 INNLEDNING	6
2 METODE	7
2.1 FELTARBEID I 2025	7
2.2 METODIKK	7
3 KARTLAGTE OMRÅDER	8
3.1 VAVATN	8
3.1.1 Vavatn (nord- og østsida)	8
3.1.2 Tangane	9
3.2 HYDALEN	9
3.2.1 Sør-Hydalsvatnet	9
3.2.2 Fetjane	10
3.2.3 Geitevatnet	10
3.2.4 Nord-Hydalsvatnet	10
3.2.5 Samlet vurdering	11
3.3 RANASTONGI-STOREBOTN	12
3.3.1 Lysebotn-Lysebottskarvet-Ranastongi	12
3.3.2 Nedre Storebotn-Storebottjerne-Øvre Storebotn	14
3.3.3 Samlet vurdering	15
3.4 GRØNDALEN	15
3.4.1 Fuglehaugen NØ	15
3.4.2 Gulliktangen-Mørkvam	16
3.4.3 Kyrkjebøslette-Kljådalen	17
3.5 BULIDALEN	17
3.5.1 Bulie øst	17
3.5.2 Bulie nord	18
3.6 VANNEN	20
3.6.1 Helgetjerne	20
3.6.2 Vannevi	20
3.6.3 Vestretjerne	20
3.7 TJERN NORD FOR SYGARDSLÅTTA	21
4 KILDER	23

1 INNLEDNING

Hemsedal kommune har fått midler til kartlegging av naturmangfold gjennom ordningen Natursats som forvaltes av Miljødirektoratet. Biofokus fikk i oppdrag av kommunen å gjennomføre et større prosjekt med bakgrunn i denne tildelingen. Dette omfattet bla. kartlegging av fugl i utvalgte områder. Miljøfaglig Utredning har gjennomført fugleundersøkelsene som underleverandør for Biofokus, med hjelp av Geir Høitomt i Kistefos Skogtjenester.

Områder ble valgt ut på bakgrunn av områder Asplan Viak i sin rapport om kartlegging av verdifulle hekkelokaliteter for fugl i Hemsedal i 2021/22 (Liebel 2023) pekte ut som potensielt viktige, men som ikke ble nærmere undersøkt den gangen. I tillegg ble det plukket ut noen områder ut fra egen kjennskap til kommunen og tips som kom inn til miljøvernleiar i Hemsedal og Gol, Jørn Magne Forland.

2 METODE

2.1 Feltarbeid i 2025

Første feltrunde ble foretatt 29.-30. mai (Bjørn Harald Larsen), mens andre runde ble lagt til 28.-29. juni (Bjørn Harald Larsen). I tillegg ble det gjort en tur 3. juli (Geir Høitomt).

I mai var fokus på Vavatnet og Hydalen, samt at nedre/midtre deler av Grøndalen og Bulidalen ble undersøkt. I juni ble et antatt fiskeørnreir ved Vestrevatnet oppsøkt, i tillegg til en tur inn mot Grøndalsbotn, som dessverre ble noe amputert pga. dårlige værforhold og flomstore elver. Også under feltarbeidet i juli gjorde været det utfordrende å få gode data om hekking i høyfjellsområder.

2.2 Metodikk

Forekomst av rødlistearter er et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet eller et større område. Rødlistestatus for arter er basert på gjeldende norsk rødliste (Artsdatabanken 2021). De fem kategoriene i rødlista er vist i tekstboks 1.

Områdenes betydning som hekkeplass for fugl er vurdert etter en egendefinert skala som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig. Hvordan disse vurderinger har blitt gjort er forklart nedenfor.

Tekstboks 1. Rødlistestatus:

CR = kritisk truet (Critically Endangered)
EN = sterkt truet (Endangered)
VU = sårbar (Vulnerable)
NT = nær truet (Near Threatened)
DD = datamangel (Data Deficient)

Lokalt viktig: Viktig hekke- og/eller rasteplass for lokale bestander av våtmarksfugl. Økologiske funksjonsområder for NT-arter.

Regionalt viktig: Viktig hekke- og/eller rasteplass for regionale bestander av våtmarksfugl. Økologiske funksjonsområder for VU-arter.

Nasjonalt viktig: Viktig hekke- og/eller rasteplass for nasjonale bestander av våtmarksfugl. Økologiske funksjonsområder for EN- og CR-arter.

Økologisk funksjonsområde: I norsk sammenheng nærmere definert i naturmangfoldloven som et område som oppfyller en økologisk funksjon for en art, slik som gyteområde, oppvekstområde, larvedriftsområde, vandrings- og trekkruiter, beiteområde, hiområde, myte- eller hårfellingsområde, overnattingsområde, spill- eller paringsområde, trekkvei, yngleområde, overvintringsområde og leveområde. Når det gjelder våtmarksfugl vil det i hovedsak være snakk om hekkeområder samt sentrale trekkruiter, rasteplasser og overvintringsområder.

3 KARTLAGTE OMRÅDER

3.1 Vavatn

3.1.1 Vavatn (nord- og østsida)

Undersøkt: Nordøstsida av Vavatn, fra Primstøyten/Valbuleino til Tangane, ble undersøkt 29.5.2025.



Figur 1. Vavatn med Tangane langs nordsida av vatnet.

Beskrivelse: Høyereliggende større regulert vatn (1124-1116 moh.), med bred reguleringssone. Flere mindre øyer.

Observasjoner: På selve vatnet ble det av våtmarksfugl/vannfugl observert 1 svartand (VU) hann, mens det på strekningen Primstøyten/Valbuleino til Tangane ble observert 2 rødstilker (NT), 1 strandsnipe og syngende gjøk (NT), blåstrupe (2 hanner) og sivspurv samt 1 par gråsisik, heipiplerke, steinskvett (vanlig rundt hele vatnet), løvsanger, gråtrost og linerle. På østsida av vatnet ble det registrert ett par med heilo (NT).

Tidligere registreringer: Tidligere er det bla. observert storlom (1 ind. 12.8.2023) og laksand (6 ind. næringssøkende 11.8.2023) på vatnet. Fjeldheim (2020) viser til at strendene som blottlegges ved nedtapping av Vavatn tiltrekker seg blant annet vadefugler og andre fjellarter som venter på at snøen skal smelte bort i fjellet, og at arter som smålom og fiskemåke bruker innsjøen i påvente av at isen går på hekkevannene.

Verdi: Innsjøen har potensielle hekkeplasser for svartand og storlom, men de store vannstandsforskjellene i løpet av hekkesesongen (med rask økning i vannstanden utover i juni), gjør området generelt lite egnet for hekking. Vavatnet vurderes ut fra årets og tidligere

registreringer som et lokalt viktig raste- og hekkeområde for våtmarksfugl, der bestanden av rødstilk (NT) har størst betydning.



Figur 2. Steinskvett var vanlig langs Vavatn, her en hann på østsida av vatnet 29.5.2025. Foto: Bjørn Harald Larsen.

3.1.2 Tangane

Undersøkt: 29.5.2025

Beskrivelse: Flatt myrområde med ett lite tjern langs nordsida av Vavatnet.

Observasjoner: Det ble observert to varslende/territoriehevdende par med rødstilk (NT) på myra, samt heipiplerke og løvsanger.

Tidligere registreringer: Ingen.

Verdi: På tross av få hekkende par, vurderes området som lokalt viktig pga. at den nær truede arten rødstilk hekker.

3.2 Hydalen

3.2.1 Sør-Hydalsvatnet


Undersøkt: 29.5.2025

Beskrivelse: Relativt langt og smalt vatn delt i to av et trangt sund (Mjåsundet). Litt myr ned mot vatnet ved innosen i nordvest, ellers lite myr langs vatnet. Mjåsundet og den helt søndre delen av vatnet ble ikke undersøkt.

Observasjoner: Følgende observasjoner ble gjort: 1 voksen sangsvane (fløy etter hvert ut dalen mot Øynadn), 1 par storlom, 1 par rødstilk (NT), 1 varslende strandsnipe, syngende gjøk (NT), blåstrupe og løvsanger, næringsøkende heipiplerke, gråtrost, taksvale (NT) og linerle.

Verdi: Storlom ble seinere på sommeren påvist hekkende i vatnet, og de registrerte vadefuglene antas også å hekke. Trolig viktig næringsområde for lokalt hekkende taksvale (på de nærmeste

stølene). Området har lokal verdi som hekkeplass for våtmarksfugl. Det må ses i sammenheng med hele våtmarksområdet i dalbunnen i Hydalen.



Figur 3. Hydalen med, fra vest til øst, Nord-Hydalsvatnet, Geitevatnet, Fetjane og Sør-Hydalsvatnet (delt av Mjåsundet).

3.2.2 Fetjane

Undersøkt: 29.5.2025

Beskrivelse: Fetjane er her brukt som betegnelse på myrområdene og elvestrekningen mellom Sør-Hydalsvatnet og Geitevatnet.

Observasjoner: Blåstrupe (2-3 syngende hanner), 3 par sivspurv, gjøk (NT), heipiplerke, rødvtingetrost, gråtrost og løvsanger.

Verdi: Området har begrenset verdi for våtmarksfugl, men må ses i sammenheng med hele våtmarksområdet i dalbunnen i Hydalen.

3.2.3 Geitevatnet

Undersøkt: 29.5.2025

Beskrivelse: Lite tjern som en utvidelse av Hydalsåne rett øst for Nord-Hydalsvatnet.

Observasjoner: Langs vatnet ble det registrert varslende strandsnipe og 1 gulerle hann, mens det ellers ble observert syngende gjøk (NT), blåstrupe og måltrost.

Verdi: Området har begrenset verdi for våtmarksfugl, men må ses i sammenheng med hele våtmarksområdet i dalbunnen i Hydalen.

3.2.4 Nord-Hydalsvatnet

Undersøkt: 29.5.2025

Beskrivelse: Mindre tjern med et fint lite delta i vestenden.

Observasjoner: Følgende observasjoner ble gjort: 1 varslende fiskemåke (VU), 1 par varslende strandsnipe samt 2 næringssøkende taksvaler (NT) og syngende gjøk (NT), heipiplerke, løvsanger, blåstrupe og sivspurv.



Figur 4. Blåstrupe hann ved Nord-Hydalsvatnet 29.5.2025. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Verdi: Fiskemåke og strandsnipe hekker ved vatnet, som også trolig er et viktig næringsområde for lokalt hekkende taksvaler (på de nærmeste stølene). Det er verdt å merke seg at Fjeldheim (2020) sier at det ikke er kjent hekkforsøk av fiskemåke i Hemsedal «i den senere tid». Området har lokal verdi som hekkplass for våtmarksfugl, inkludert en sårbar art. Det må ses i sammenheng med hele våtmarksområdet i dalbunnen i Hydalen.

3.2.5 Samlet vurdering

Hele det sammenhengende våtmarksområdet i dalbunnen i Hydalen, fra Lysebotnånes delta i Nord-Hydalsvatnet til Hydalsånes utløp fra Sør-Hydalsvatnet, har et nokså bredt spekter av våtmarksmiljøer. Hekkefuglfaunaen vurdert etter tidligere og årets registreringer innbefatter mange våtmarksarter, men i små populasjoner. I alt ligger det ute 1007 fugleobservasjoner fra Hydalen, med de første registreringene tilbake i 1975. Av våtmarksfugl hekker eller antas å hekke krikand, toppand (sist påvist hekkende i 2017), storlom (påvist i 2025 på Sør-Hydalsvatnet), trane (pullus merket Nord-Hydalen i 2023), enkeltbekkasin (opptil 3 revirhevdende hanner registrert), rugde, rødstilk (NT) (minst 2 par), strandsnipe (2-3 par), fiskemåke (VU) (1 par i Nord-Hydalsvatnet i 2025), vintererle og sivspurv, muligens også laksand. Kvinand er påfallende sjelden i området, mens heilo (NT) trolig hekket i dalen i 2014.

Mange arter bruker området til næringssøk i hekketida, slik som myrhauk (EN), tårnfalk, dvergfalk og sangsvane. Sistnevnte ses ofte, men fortsatt er det ikke registrert hekking av arten. Det samme gjelder haukugle, mens jordugle muligens hekket i 2017. Voksne havørner ses relativt ofte i området, både overflygende og næringssøkende, mens kongeørn og fjellvåk bare er registrert overflygende. Sivhauk (NT) og gråhegre har blitt sett mer tilfeldig på høsten.

Ringmerking har vist at det foregår et trekk av spurvefugler gjennom dalen, og svært sjeldne arter for innlandet som f.eks. gulbrynsanger og dvergspurv (VU) er fanget på høsten, i tillegg til bla. båndkorsnebb (VU).


Samlet vurderes våtmarksområdet i dalbunnen i Hydalen som et regionalt viktig hekke- og næringsområde for våtmarksfugl.

3.3 Ranastongi-Storebotn

3.3.1 Lysebotn-Lysebottskarvet-Ranastongi

Undersøkt: 03.7.2025

Beskrivelse: Høgereliggende fjellterreng opp mot toppen av Ranastongi (1900 moh.). Flere nokså markerte bekke- og innsjødrag, samt innslag av små tjern i Lysebotn (ca. 1400 moh.).



Figur 5. Områdene Lysebotn-Lysebottskarvet-Ranastongi.



Figur 6. Mot Lysebotn fra sør. Foto: Geir Høitomt, 03.07.2025.

Observasjoner: Feltarbeidet i 2025 ble vanskeliggjort av sterk vind med snøbyger utover dagen, noe som resulterte i minimumstall både på antall arter og individer.

Langs stien opp mot Lysebottskarvet ble det observert minimum 1 par heilo (NT), samt heipiplerke (min. 3 par), løvsanger, rødvingetrost, gråtrost og ravn (1 individ overflygende). 1 fossekall kom flygende langs bekken (Lysebotntåne), men uten hekkeadferd.

Oppe på Lysebottskarvet ble det sett 1 snøspurv (hann), samt 1 fjellrype. Utfordrende vindforhold gjorde imidlertid registreringene mangelfulle.



Figur 7. Snøspurv ble påvist på Lysebottskarvet, og arten er trolig hekkefugl i dette miljøet. Foto: Geir Høitomt, 03.07.2025.

Ved tjernene i Lysebotn ble det sett 1 par heilo (NT) (mulig hekking) og 1 sandlo (uten hekkeadferd).


Tidligere registreringer: På Artskart foreligger det få tidligere observasjoner av fugl fra dette delområdet. Snøspurv med mulig hekkeadferd er imidlertid påvist på Lysebottskarvet i 2021, samt heilo lengre nede langs stien i 2023 (mulig hekking).

Verdi: Området har minst lokal verdi som hekkeplass for våtmarksfugl og høgfjellsarter som snøspurv og fjellrype. Økologisk funksjonsområde for heilo (NT).

3.3.2 Nedre Storebotn-Storebottjerne-Øvre Storebotn

Undersøkt: 03.7.2025

Beskrivelse: Høyfjellsplatå inn mot Storebottjerne (1381 moh.), med flere småtjern nord og øst for dette tjernet.



Figur 8. Øvre Storebotnen, Storebottjerne og Nedre Storebotn.



Figur 9. Fra flyene øst for Storebottjerne (som ses til venstre i bildet). Foto: Geir Høitomt, 03.07.2025.

Observasjoner: Feltarbeidet i 2025 ble vanskeliggjort av sterk vind med kraftige snøbyger utover dagen, noe som resulterte i minimumstall både på antall arter og individer.

På flyene innover mot Storebottjerne ble det påvist minst 2 par varslende heilo (NT), samt løvsanger, rødvingetrost, ringtrost, steinskvett og heipiplerke. Disse flyene har også potensiale som hekkeplass for fjellerke (egnet landskap og tidligere funn), men i de rådende værforholdene ble den er vanskelig art å påvise og kun ett individ ble observert.

Det ble også påvist flere individer (trolig 3 par) av heilo inn mot Storbottjerne, samt boltit (1 individ) og fjellrype (1 hann) nord for dette tjernet.



Figur 10. Fjellerke har trolig en fast hekkebestand i dette delområdet. Foto: Geir Høitomt, 03.07.2025.

Tidligere registreringer: På Artskart foreligger det en del tidligere observasjoner av fugl fra dette delområdet (totalt 106 funn fordelt på 21 arter). Dette omfatter interessante arter som heilo (NT), rødstilk (NT), svømmesnipe, sandlo, fjæreplytt, boltit, gjøk (NT), snøspurv og fjellerke. Fjeldheim (2020) nevner hele 13 spillende boltit i Storebotn i 2015, og flere kull observert på ettersommeren.

Verdi: Økologisk funksjonsområde for heilo (NT), svømmesnipe (NT) og rødstilk (NT). Området vurderes å ha lokal til regional verdi som hekkeplass for våtmarksfugl og høgfjellsarter som boltit, fjellerke, snøspurv og fjellrype.

3.3.3 Samlet vurdering

Høyfjellsområdene opp mot Ranastongi og Øvre Storebotnen representerer et sammenhengende fugleområde som innehar en interessant fuglefauna. Totalt er det innenfor de 2 delområdene påvist 112 fuglearter (Artskart), hvorav 4 rødlistearter: Heilo (NT), rødstilk (NT), svømmesnipe (NT) og gjøk (NT).

Området har sin største verdi i ornitologisk sammenheng som hekkeområde for høgfjellsarter som boltit, heilo (NT), fjellrype, fjellerke og snøspurv. Også sandlo og fjæreplytt er påvist, og kan være regelmessige hekefugler.

Samlet vurderes dette høyfjellsområdet å ha klar lokal til regional verdi som hekke- og næringsområde for våtmarksfugl og en særegen høyfjellsfauna.

3.4 Grøndalen

3.4.1 Fuglehaugen NØ


Undersøkt: 29.5.2025

Beskrivelse: Myrer og småputter øst for Mørekvamvegen.

Observasjoner: I 2025 ble det registrert 1 krikkannd hunn i området.

Tidligere registreringer: Tidligere har det blitt sett 2 næringssøkende traner i området (14.5.2022), og lokaliteten egner seg godt som hekkeområde for trane.

Verdi: Området har trolig noe verdi som hekkeplass for våtmarksfugl.



Figur 11. Områdene Fuglehaugen NØ og Gulliktangen-Mørekvam i Grøndalen.

3.4.2 Gulliktangen-Mørekvam

Undersøkt: 29.5.2025

Beskrivelse: Myrer, elveloner, flomdammer og kroksjøer i dalbunnen mellom Fuglehaugen og Mørekvamstølen.

Observasjoner: Bare østsida av elva ble undersøkt i 2025. Her ble det observert ett par krikand, 1 par rødstilk (NT), 1 par strandsnipe, 2 par gulerle, 3-4 syngende blåstrupehanner og 4 næringssøkende taksvaler (NT) – i tillegg til arter som heipiplerke, løvsanger, kråke, rødvingetrost, gråtrost og rødstrupe.

Tidligere registreringer: På lokaliteten Mørekvam i Artsobservasjoner ligger det 46 observasjoner, bla. av Buskeruds første registrering av vierspurv (CR) fra 12.-13. juni 1977. Det er lite opplysninger om hekking av våtmarksfugl fra området, men verdt å merke seg er ca. 30 enkeltbekkasiner 16.5.2010. Trane kan muligens hekke også på denne siden av Mørekvamvegen. Haukugle er registrert flere ganger, jordugle ble sett her 1.8.2020 og varslar ble observert 7.4.2019.



Figur 12. Grøndøla renner rolig gjennom dalbunnen ved Gulliktangen, og i tillegg til små elveører som ses på bildet, er det også små loner, flomdammer og kroksjøer i dette våtmarksområdet. Foto: Bjørn Harald Larsen, 29.5.2025.

Verdi: Sett i sammenheng med myrområdene øst for Mørekvamvegen (se kap. 3.4.1) og ikke undersøkte våtmarksområder på vestsida av Grøndøla, er området minst av lokal verdi som hekkeplass for våtmarksfugl.

3.4.3 Kyrkjebøslette-Kljådalen

Undersøkt: 30.6.2025

Beskrivelse: For det meste hurtigstrømmende elvestrekning med noen roligere partier og mindre myrer inntil.

Observasjoner: Bare østsida av elva ble undersøkt i 2025. På vestsida ble det observert 2 par enkeltbekkasin, 1 par strandsnipe og 1 fossekall.

Tidligere registreringer: De eneste registreringene av fugl i Kljådalen stammer fra 1960- og 1970-tallet, og fra Kljåen i perioden 2020-2025. Av våtmarksfugl er det kun snakk om observasjoner av strandsnipe og fossekall.

Verdi: Området har liten verdi som hekkeplass for vann- og våtmarksfugl.

3.5 Bulidalen

3.5.1 Bulie øst

Undersøkt: 29.5.2025

Beskrivelse: Mindre myrområder med småpytter i veksling med boreal hei og fjellbjørkeskog, små elveloner.

Observasjoner: Myrene på sørsida av Buliåne mellom Preinsrud og Bulie ble undersøkt. Av vannfugl ble kun strandsnipe observert langs elva, mens det ellers ble registrert syngende gjøk (NT), blåstrupe (2 hanner), heipiplerke og løvsanger.



Figur 13. Myrene på sørsida av Buliåne har våte partier, men lite tjern og pytter, og det er nok avgjørende for at det er lite hekking av våtmarksfugl her. Foto: Bjørn Harald Larsen, 29.5.2025.


Tidligere registreringer: I Artsobservasjoner ligger det inne noen fugleobservasjoner fra «Bulidalen», som nok omfatter et større område. På lokaliteten er det bla. registrert heilo (NT) i 1979, haukugle i 2018, lirype, orrfugl og vendehals.

Verdi: Området har liten verdi som hekkeplass for vann- og våtmarksfugl. Myrene er tilsynelatende godt egnet for hekking av våtmarksfugl, med flere småpytter, men ingen observasjoner ble gjort av våtmarksfugl på myrene.

3.5.2 Bulie nord

Undersøkt: 29.5.2025

Beskrivelse: Intermediære til svakt kalkrike bakkemyrer nord og nordvest for Bulie.



Figur 14. Områdene Bulie øst og Bulie nord i Bulidalen.

Observasjoner: Rødstilk (NT) varslet i nedre del av myrområdet, mens det ellers ble registrert jaktende tårnfalk, 2-3 syngende blåstruper, heipiplerke, løvsanger og gråtrost. Det ble lett spesielt etter dobbeltbekkasin i området i mai 2025, da myrene var godt egnet for arten. Det ble spilt lyd av spillende dobbeltbekkasin, uten respons.



Figur 15. Bakkemyrene innerst i Bulidalen har godt egnede habitater for dobbeltbekkasin (NT), og arten er registrert her tidligere – men ingen observasjoner ble gjort i 2025. Foto: Bjørn Harald Larsen, 29.5.2025.

Tidligere registreringer: Dobbeltbekkasin (NT) ble observert i dette myrområdet i 2011 og 2015, og begge observasjoner gjelder ett individ i første halvdel av august.

Verdi: Området har lokal verdi som hekkeplass for våtmarksfugl, med ett par av den nær truede arten rødstilk, samtidig som det fortsatt er mulig at dobbeltbekkasin har tilhold her.

3.6 Vannen

3.6.1 Helgetjerne

Undersøkt: 28.5.2025

Beskrivelse: Flere mindre tjern omkranset av myrer med småpytter.

Observasjoner: På det østre av Helgetjerne lå det ett toppandpar, mens trane gikk av reir på myra nordvest for dette tjernet.

Tidligere registreringer: Grønnstilk, strandsnipe, gulerle og toppand ble notert som trolig hekkende i juni 2021, mens næringssøkende fugler av storskarv (NT), konglebit (NT), gråhegre og trane også har blitt observert.

Verdi: Området har lokal verdi som hekkeplass for våtmarksfugl, med små bestander av utbredte arter.

3.6.2 Vanneviki

Her ble det observert 1 voksen storlom 28.5.2025, og arten har her gode muligheter for hekking på ei øy øst for bruket Vanneviki. Storlom er også tidligere notert her med «mulig reproduksjon» (Artsdatabanken 2025).



3.6.3 Vestretjerne

Undersøkt: 28.6.2025

Beskrivelse: Mindre tjern omkranset av barskog, noe myr inntil vatnet i nord.

Observasjoner: Fiskeørn kom inn med fisk til reir langs østsida av tjernet. Reiret ligger i toppen av ei furu noen få meter fra tjernet.



Figur 16. Fiskeørnreiret hadde en klassisk plassering i toppen av ei furu med avflatende topp. Furua lå noen få meter fra vannkanten langs østsida av Vestretjerne. Foto: Bjørn Harald Larsen, 28.6.2025.

Tidligere registreringer: Området ble undersøkt etter at det kom et tips om et mulig fiskeørnreir her fra Vegard Bang Fjeldheim til Jørn Magne Forland i Hemsedal kommune.

Verdi: Som hekkeplass for en sårbar art vurderes dette som et regionalt viktig område. Fiskeørn er sjelden som hekkefugl så langt nord i Buskerud, og samtidig er hekkeplassen av de høyest beliggende i landet.

3.7 Tjern nord for Sygardslåtta

Våtmarksområdet langs Hemsli mellom Eikreslåttene og Eikredammen er svært godt undersøkt fra tidligere, og det ble under årets registreringer kun gjort en tilfeldig observasjon fra rv. 52, av en rugende sangsvane på tjernet nord for Sygardslåtta.



Figur 17. Rugende sangsvane på tjern nord for Sygardslåtta 29.5.2025. Foto: Bjørn Harald Larsen.

4 KILDER

Artsdatabanken 2021. Norsk rødliste for arter 2021.

<https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/>

Artsdatabanken 2025. Artskart. Hentet 10.11.2025 fra <https://artskart.artsdatabanken.no/>

Fjeldheim, V. B. 2020. Avifauna i Hemsedal kommune. Hallingdal ringmerkingsgruppe. 55 s.

Liebel, H. 2023. Kartlegging av verdifulle hekkelokaliteter for fugl i Hemsedal kommune 2021/22.

Asplan Viak. Rapport. 17 s.

Miljødirektoratet 2025. Naturbase. Hentet 10.11.2025 fra

<https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase>



Miljøfaglig Utredning AS ble etablert i 1988. Firmaet tilbyr miljøfaglig rådgivning. Virksomhetsområdet omfatter blant annet:

- Kartlegging og konsekvensanalyse på fagtema naturmangfold
- Skjøtselsplaner og forvaltningsplaner
- Utarbeiding av kart (illustrasjonskart og GIS)
- FoU-virksomhet
- Kurs og foredrag

Hjemmeside: www.mfu.no

Org.nr.: 984494068 MVA